

Diagnose:

Rektumprolaps

Therapie:

Reponierung, Tabaksbeutelnaht, Infusion, Antibiose, Schmerzmittel

Medikamente:

- 1mal täglich 1ml Lactulose-Sirup mit dem Futter verabreichen
- 1 mal täglich 0,45ml Metacam per os mit etwas Futter verabreichen

Anmerkungen:

Die Ursache für den Rektumprolaps ist bisher noch nicht gefunden worden (evtl. Darmparasiten etc.). Daher ergeht der Rat zur parasitologischen Kotuntersuchung (Sammelprobe von 3 Tagen). Da Yuki bei uns die Futteraufnahme verweigert, wird das Tier heute Entlassen. Bitte bringen Sie Kotproben zur Kontrolluntersuchung mit. Solange die Grundursache für den Prolaps nicht gefunden wurde, kann es zu Rezidiven kommen. Sollte nach Ziehen der Tabaksbeutelnaht wieder ein Prolaps auftreten, ergeht der Rat zur Colopexie (Fixierung des Darms an der Bauchwand). Bei diesem, in Narkose durchgeführten Eingriff, sollten ebenfalls Proben der Hautveränderungen genommen werden. Bitte stellen Sie Yuki zu einer Kontrolluntersuchung und zum Ziehen der Tabaksbeutelnaht am Mittwoch wieder vor. Sollte die Kotuntersuchung keinen Auffälligkeiten zeigen ergeht der dringende Rat, Yuki in der Klinik für Innere Medizin vorzustellen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

I.A. / i.V.

(Alexander Acker)